

ハクサイ 主な病気・害虫の年間発生（秋普通栽培）

		7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			発生部位 発生条件
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	
栽培暦		○...○ 播種			○...○ 定植			—			■ 収穫期												
病 気	モザイク病	■																					葉。アブラムシ媒介。
	軟腐病							■			■												地際部、葉の基部。傷口感染。降雨で多発生。
	黒斑細菌病	■			■			■			■												葉。傷口、気孔、水孔感染。降雨で多発生。
	白斑病							■			■			■									葉、空気伝染
	黒斑病							■			■			■									葉、空気伝染
	尻腐れ病										■			■									葉の基部で地面と接する部分。土壌感染。
	根こぶ病				■			■			■			■									根。土壌感染。土壌の酸性と土壌水分過多で多発生。
	黄化病							■			■			■									根。土壌伝染。晩成種栽培では発生は軽い。
害 虫	ヨトウムシ							■			■												葉、球
	コナガ							■			■			■									葉
	アオムシ							■			■			■									葉
	アブラムシ類										■			■									葉、新芽
	ダイコンサルハムシ							■			■			■									葉